



Système de pâture de Michel Guex à Matran

Historique : choix de la pâture = choix économique

Dès 1996 : pâture sur gazon court

avec complémentation maïs ensilage pendant la traite (35 vaches - 7 ha).

Avantages: minimum de travail et facilite la traite des vaches attachées.

Inconvénients : entrée du parc au même endroit que l'abreuvoir, difficulté d'évaluer la quantité de fourrage conservé à distribuer à l'étable, salissement de la place d'alimentation, utilisation de fourrages conservés prévus pour l'hiver

2002 : voyage d'étude en Irlande

Mon choix : Pâture tournante, intégrale et alternée + vêlages saisonniers février mars

Avantages

- intégrale; pas d'aliment à la crèche de fin avril à mi-novembre
- parfaite adéquation entre la courbe de croissance de l'herbe et la courbe de lactation par le vêlage saisonnier.
- par mon exploitation : tous les herbages sont situés à l'ouest de la ferme
- meilleure utilisation des différents types de sols, d'exposition et de composition des prairies : printaniers, tardifs, humifères.
- les vaches ne rentrent à la ferme que pour être traites, ne salissent ni l'aire d'alimentation ni l'aire de couche, travail minimum
- pas de coupe de nettoyage
- bonne image

Inconvénients

- pointes de travail lors des vêlages
- météorisation : gonfle sur certaines parcelles riches en trèfles
- approvisionnement en eau des parcelles éloignées
- type de vaches ?
- en cas de diminution anormale de production : est-ce la météo, pluie - froid - chaud ? la qualité de l'herbe ? le manque d'herbe ? trop jeune ? trop vieille ? la sécheresse ?
- logistique : où pâturer demain ?

Technique

Fin mars pâture à la mi-journée, puis à la journée sur des parcelles de 2,5 à 5 ha : déprimage!

Fin avril à mi-novembre : pâture intégrale, les vaches ne rentrent à la ferme que pour la traite.

Toute la surface herbagère est clôturée : 30 parcs de environ 70 ares ; 1 parc est utilisé un jour et demi. Après la traite les vaches ont une partie de ce parc 1/2 - 1/4 - 1/4 pour 50 vaches.

Annuellement : 5 à 7 pâtures + 2 coupes

Fumure : - 50 kg Nitrate d'am / parc après chaque utilisation : = 20 unités/ha
- purin après fauche, occasionnellement.

Utilisation des coupes : enrubannage.

Temps d'attente entre 2 passages : 18 - 20 jours en mai-juin ; 25 - 30 jours juillet-septembre.