



Communiqué de presse juillet 2001

## Pâtûre sur gazon court

### C'est le moment pour la deuxième extension de surface

En pâtûre sur gazon court, les surfaces à disposition des vaches doivent être agrandies en cours de saison en fonction de la baisse de productivité saisonnière des prairies. Une première extension d'environ 8 ares par vache a été réalisée à la fin mai après avoir conservé la première coupe.

Vers la fin juillet, il est à nouveau nécessaire de mettre à disposition des vaches une nouvelle surface de 8 à 10 ares par vache. Cet agrandissement doit se réaliser 4 à 7 jours au plus tard après la coupe précédente.

La pâtûre sur gazon court est plus facile à gérer si l'on se limite à ces deux extensions uniquement. Les aléas de la météo seront compensés par plus ou moins de fourrage à l'intérieur durant la traite. Lors de périodes à forte pousse, on diminuera les quantités de fourrage distribuées à la crèche. On passera par exemple de 3 kg de foin par jour et par vache à 1 kg, et vice versa en période de faible pousse on passera de 3 kg à 5 kg par jour. De ce fait, on obtiendra une ration de base régulière durant toute la période estivale. Rappelons que la complémentation à la crèche peut se faire avec du maïs plante entière ou du foin, mais ce doit être du bon foin. Les expériences faites par les agriculteurs démontrent que la complémentation à la crèche avec de l'herbe ne donne que rarement satisfaction.

**Institut agricole Grangeneuve**

Service production fourragère  
et conservation des fourrages

*Jean-Pierre Rolle*